Influenza Vaccination (Flu Shot) – Medical History

インフルエンザ予防接種予診票(英語)

	e boxes.接種希望の方へ:太ワク内 にご記人く ate knowledge of their child's health condition may fill o		child 성고수	before exam	°C
	ate knowledge of their child's health condition may fill o 状態をよく把握している保護者がご記入ください。	out the form for their	uniu. ね丁さ	診察前の体温	
Address 住所		TEL			
Name of patient		Sex	□Male 男		Famala tr
受ける人の名前		性別			Female 女
(Guardian's name)		Date of Birth			nth 月 day 日
(保護者の氏名)		生年月日	(years	old	hs)ヶ月)
	Answers 回答欄			Doctor's Notes 医師記入欄	
	and understand the explanation about the about to receive today?	□ No いいえ		☐ Y	es V
今日受ける予防接種			144	, V ·	
2 Is today your first	□ No いいえ □ Yes This is my time 回目 はい				
一 「日文りのインノルー	エンザ予防接種は今シーズン1回目ですか	This is my My last shot was month	前回の接種は		, v
3 Are you feeling sic 今日、体に具合の悪	□ Yes ある □ No ない				
4 Are you currently g 現在、何かの病気で	□ Yes はい			No いえ	
•Are you receiving	□ Yes はい			No I	
治療(投薬など)を受	│ │ No いいえ			ルバえ Yes	
・Did the doctor treating you say it was alright to get the influenza vaccination? その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか。		No V V X			es ;\v
5 Have you been sicl 最近1ヶ月以内に病気	□ Yes はい			vo	
6 Have you ever bee	n diagnosed with a serious illness?	□ Yes はい	\ mills 1 hebs-		No
今までに特別な病気	□cardiovascular 心臓血管系 いいえ □ いは いいえ □ いは いは にない いん □ には にない いん □ には いん にない にない はんしょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう			いえ	
		□liver 肝臓			
1		□ blood diseas □ immunodeficie		· 京不全症	
	been diagnosed with interstitial pneumonia,	□ Yes はい	year_年m	onth 月頃 🛭 N	
bronchial asthma, or other types of respiratory illnesses? If so, are you currently in treatment? 間質性肺炎や気管支喘息等の呼吸器系		□Currently in treatment 現在治療中 いいえ □Not in treatment 治療していない			いえ
疾患と診断され、現在	E、治療中ですか				
8 Have you ever had 今までにけいれん(ひ	□ Yes ある <u>times</u> 回ぐらい □ No The last one was 最後は year ない				
		年 <u>month</u> 月		year 12	V
9 Have you ever ha medicines or foods	ad a rash, hives, or other reaction to certain	□ Yes ある Medicine or food	namo:		
薬や食品で皮膚に発	薬または食品の名前				
とがありますか		□eggs 卵 □ □other その他		3	
10 Have you or ar	ny of your relatives been diagnosed with a	□ Yes はい	14		10
congenital immuno 近朝老四失天概免应	deficiency? 不全と診断された方がいますか			()	いえ
	r family, or anyone around you contracted	□ Yes いる			10
	nicken pox, or mumps in the last month?	□ measles 麻	しん □rube	ella 風し い	ない
かった方がいますか	周囲で麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにか 。	ん □chicken pox			
12 Have you received	d any vaccinations in the last month?	□ mumps おた	こふくかぜ		lo.
1ヶ月以内に予防接種		Name of vaccin	ation		いえ
13 Have you ever fel	t sick after receiving a vaccination?	予防接種名 □ Yes ある			Jo
これまでに予防接種を	Name of vaccination 予防接種名 ない				
	□Influenza vaccination インフルエンザ予防接種				
		□Other その作			
14 (Women only) Are (女性の方に)現在妊	e you currently pregnant? 娠していますか	□ Yes はい		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	lo いえ
15 (If the vaccination	☐ Yes ある ☐ No				
(予防接種を受けられる方がお子さんの場合) Were there any problems with the child's health during labor,		□labor 分娩時 ない □delivery 出生時			
delivery, or infancy	?	□infancy 乳幼			
	幼児健診などで異常がありましたか ther things about your health that you want to				
	ease write them here その他 健康状能のことで				

医師に伝えておきたいことがあれば、具体的に書いてください。
医師の記入欄:以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる) 医師の署名又は記名押印本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応及び医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明した。

After an examination with the doctor, I have heard and understood the doctor's explanation about the vaccination, its effects and purpose, and the possibility of serious side effects.

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性な どについて理解した上で、接種を希望しますか。

- □Yes, I want to receive the vaccination 接種を希望します
- □No, I do not want to receive the vaccination 接種を希望しません

Patient's Signature (Guardian's Signature) 本人の署名(または保護者の署名)

*Patients that are not able to write themselves must have a representative sign and state their relationship to the patient. 自書できない者は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載。

使用ワクチン名		用法・用量	実施場所・医師名・接種日時
インフルエンザ HA ワクチン □ 化血研 □ デンカ生研 カルテ No.	Lot.No.	皮下接種 □0.5ml(3歳以上) □0.25ml(6ヶ月以上3歳 未満)	実施場所: 医師名: 接種日時: 平成 年 月 日 :時 分

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。 そのため、予診票に出来るだけ詳しくご記入ください。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護 者がご記入ください。

[ワクチンの効果と副反応]

予防接種により、インフルエンザの発病を阻止したり、インフルエンザによる合併症や死亡などを予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれることがありますが通常は2~3日で消失します。発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ腫膨張、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛なども起こることがありますが通常は、2~3日で消失します。過敏症として、発しん、じんましん、湿しん、紅斑、多形紅斑、かゆみなども起こります、その他に、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢系ニューロパチー、ぶどう膜炎があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は、重篤な副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作、(7)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(8)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。なお、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて救済手続きを行うことになります。

[予防接種を受けることができない人]

- 1 明らかに発熱のある人 (37.5℃以上の人)
- 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 3 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人 なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて 判断を仰いでください。
- 4 その他、医師が予防接種を受けることが不適当を判断した人

[予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人]

- 1 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 2 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 3 かぜなどのひきはじめと思われる人
- 4 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱のみられた人及び発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 5 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんがでたり、体に異常をきたしたことのある人
- 6 今までのけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある人
- 7 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常をしてきされたことのある人
- 8 妊娠している人
- 9 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人

[ワクチン接種後の注意]

- 1 インフルエンザワクチンを受けたあと 30 分間は、急な副反応が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 2 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 3 接種当日はいつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 4 万一、高熱やけいれん等の異常な症状がでた場合、速やかに医師の診察を受けてください。

The Influenza Vaccination

In order to administer the influenza vaccination (or flu shot) to a patient, we must first know the patient's health condition, so please fill out the medical history sheet as thoroughly as possible. A guardian with adequate knowledge of their child's health condition may fill out the form for their child.

Effects and Side Effects of the Vaccination

With the vaccination, it is possible to prevent influenza and the complications and deaths associated with the influenza virus.

Generally, side effects are mild. The injection site may redden, become swollen, become hard, feel hot, hurt, or feel numb, but these symptoms normally disappear within 2-3 days. You may also experience fever, chills, headaches, lethargy, temporary loss of consciousness, dizziness, swollen lymph nodes, vomiting or nausea, stomachaches, diarrhea, loss of appetite, joint pain, and/or muscular pain, but these symptoms normally disappear within 2-3 days. An oversensitivity to the vaccination may lead to rashes, hives, eczema, erythema, erythema multiforme, and/or itchiness, as well as facial palsy and other forms of paralysis, peripheral neuropathy, and/or uveitis. Please tell your doctor if you have a strong allergy to eggs, as there is the possibility of serious side effects. The following side effects are extremely rare but have been known to occur: 1) shock, anaphylactic reaction (hives, difficulty breathing, etc), 2) acute disseminated encephalomyelitis (fever, headaches, seizures, impaired mobility, impaired consciousness, etc, within 2 weeks after receiving the vaccination), 3) Guillain-Barre syndrome (numbness in both hands or feet, difficulty walking, etc), 4) seizures (including fever convulsions), 5) liver function impairment, jaundice, 6) emergence of asthma symptoms, 7) thrombocytopenic purpura, decrease in platelets, 8) vasculitis (allergic purpura, allergic granulomatous angiitis, leukocytoclastic vasculitis, etc). Please tell your doctor if you have any symptoms corresponding to the above side effects. If you have suffered an injury to your health (any sickness or injury that requires hospitalization), you or your family can receive relief services in accords with the Law for the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency.

Patients that cannot receive the influenza vaccination:

- 1 Patients found with a high fever (above 37.5°C)
- 2 Patients found to be suffering from a serious acute illness
- 3 Patients who have had an anaphylactic reaction to the influenza vaccination in the past Additionally, patients who have had an anaphylactic reaction to any administered or prescribed medicine in the past must tell their doctors before receiving the influenza vaccination.
- 4 Any other person determined by their doctor to be unable to receive the vaccination

Patients that must consult with their doctor before receiving the influenza vaccination:

- 1 Patients with heart disease, kidney disease, liver disease, blood disease, or other serious illness
- 2 Patients with delayed development and receiving care from their doctor and health nurses
- 3 Patients recovering from a cold or other illness
- 4 Patients that had a fever within two days of a vaccination, or allergic complications like rashes or hives
- 5 Patients who have experienced rashes on the skin from medicine or food (containing chicken eggs or chicken meat), or otherwise felt unwell
- 6 Patients who have experienced seizures (convulsions) in the past
- 7 Patients who have been diagnosed with or have had relatives diagnosed with immunodeficiencies in the past
- 8 Pregnant women
- 9 Patients with interstitial pneumonia, bronchial asthma, or other types of respiratory illnesses

Caution - Please Read

- 1 You may experience sudden side effects in the 30 minutes after receiving the influenza vaccination. Stay within the medical facility so that you can observe your symptoms and promptly contact a doctor if necessary.
- 2 Keep the injection site clean and hygienic. You may use the shower or bath the same day you have been vaccinated but do not rub, scratch, or scrub the injection site.
- 3 Continue your daily routine on the day of the vaccination. Avoid extreme exercise or over-consumption of alcohol.
- 4 In the small chance that you experience a high fever, seizures, or other serious side effects, please consult a doctor as soon as possible.